

Aus dem Hygiene-Institut der Universität Marburg an der Lahn
Direktor: Professor Dr. med. R. Sievert

THESIS

MARBURG

1968

**Untersuchungen
zur biochemischen Differenzierung
nichtproliferierender Bakterien
aus den Ordnungen Pseudomonadales,
Eubacteriales und Actinomycetales**

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades der Zahnheilkunde
der hohen Medizinischen Fakultät
der Philipps-Universität Marburg

vorgelegt von

Klaus Royé
aus Osnabrück

Marburg 1968

Fotodruck von Erich Mauersberger in Marburg

Aus dem Hygiene-Institut der Universität Marburg an der Lahn
Direktor: Professor Dr. med. R. Siegert

**Untersuchungen
zur biochemischen Differenzierung
nichtproliferierender Bakterien
aus den Ordnungen Pseudomonadales,
Eubacteriales und Actinomycetales**

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades der Zahnheilkunde
der hohen Medizinischen Fakultät
der Philipps-Universität Marburg

vorgelegt von

Klaus Royé

aus Osnabrück

Marburg 1968

Angenommen von der Medizinischen Fakultät der
Universität Marburg am: 1.2.1968

Gedruckt mit der Genehmigung der Fakultät

Dekan: Professor Dr.med. R. Siegert

Referent: Professor Dr.med. R. Siegert

Correferent: Professor Dr.med. et Dr.med.dent. habil. H. Heuser

INHALT

1. Vorwort	1
2. Inhaltsverzeichnis	2
3. Einleitung	3
4. Hauptteil	4
5. Schluss	5
6. Literaturverzeichnis	6
7. Anhang	7
8. Zusammenfassung	8
9. Bibliographie	9
10. Glossar	10
11. Index	11
12. Nachwort	12
13. Danksagung	13
14. Impressum	14
15. Verlagsinformation	15
16. Kontakt	16
17. Copyright	17
18. Druck	18
19. Papier	19
20. Bindung	20
21. Preis	21
22. Bestellen	22
23. Versand	23
24. Retoure	24
25. Haftung	25
26. Sonstiges	26
27. Impressum	27
28. Verlagsinformation	28
29. Kontakt	29
30. Copyright	30
31. Druck	31
32. Papier	32
33. Bindung	33
34. Preis	34
35. Bestellen	35
36. Versand	36
37. Retoure	37
38. Haftung	38
39. Sonstiges	39
40. Impressum	40
41. Verlagsinformation	41
42. Kontakt	42
43. Copyright	43
44. Druck	44
45. Papier	45
46. Bindung	46
47. Preis	47
48. Bestellen	48
49. Versand	49
50. Retoure	50
51. Haftung	51
52. Sonstiges	52
53. Impressum	53
54. Verlagsinformation	54
55. Kontakt	55
56. Copyright	56
57. Druck	57
58. Papier	58
59. Bindung	59
60. Preis	60
61. Bestellen	61
62. Versand	62
63. Retoure	63
64. Haftung	64
65. Sonstiges	65
66. Impressum	66
67. Verlagsinformation	67
68. Kontakt	68
69. Copyright	69
70. Druck	70
71. Papier	71
72. Bindung	72
73. Preis	73
74. Bestellen	74
75. Versand	75
76. Retoure	76
77. Haftung	77
78. Sonstiges	78
79. Impressum	79
80. Verlagsinformation	80
81. Kontakt	81
82. Copyright	82
83. Druck	83
84. Papier	84
85. Bindung	85
86. Preis	86
87. Bestellen	87
88. Versand	88
89. Retoure	89
90. Haftung	90
91. Sonstiges	91
92. Impressum	92
93. Verlagsinformation	93
94. Kontakt	94
95. Copyright	95
96. Druck	96
97. Papier	97
98. Bindung	98
99. Preis	99
100. Bestellen	100
101. Versand	101
102. Retoure	102
103. Haftung	103
104. Sonstiges	104
105. Impressum	105
106. Verlagsinformation	106
107. Kontakt	107
108. Copyright	108
109. Druck	109
110. Papier	110
111. Bindung	111
112. Preis	112
113. Bestellen	113
114. Versand	114
115. Retoure	115
116. Haftung	116
117. Sonstiges	117
118. Impressum	118
119. Verlagsinformation	119
120. Kontakt	120
121. Copyright	121
122. Druck	122
123. Papier	123
124. Bindung	124
125. Preis	125
126. Bestellen	126
127. Versand	127
128. Retoure	128
129. Haftung	129
130. Sonstiges	130
131. Impressum	131
132. Verlagsinformation	132
133. Kontakt	133
134. Copyright	134
135. Druck	135
136. Papier	136
137. Bindung	137
138. Preis	138
139. Bestellen	139
140. Versand	140
141. Retoure	141
142. Haftung	142
143. Sonstiges	143
144. Impressum	144
145. Verlagsinformation	145
146. Kontakt	146
147. Copyright	147
148. Druck	148
149. Papier	149
150. Bindung	150
151. Preis	151
152. Bestellen	152
153. Versand	153
154. Retoure	154
155. Haftung	155
156. Sonstiges	156
157. Impressum	157
158. Verlagsinformation	158
159. Kontakt	159
160. Copyright	160
161. Druck	161
162. Papier	162
163. Bindung	163
164. Preis	164
165. Bestellen	165
166. Versand	166
167. Retoure	167
168. Haftung	168
169. Sonstiges	169
170. Impressum	170
171. Verlagsinformation	171
172. Kontakt	172
173. Copyright	173
174. Druck	174
175. Papier	175
176. Bindung	176
177. Preis	177
178. Bestellen	178
179. Versand	179
180. Retoure	180
181. Haftung	181
182. Sonstiges	182
183. Impressum	183
184. Verlagsinformation	184
185. Kontakt	185
186. Copyright	186
187. Druck	187
188. Papier	188
189. Bindung	189
190. Preis	190
191. Bestellen	191
192. Versand	192
193. Retoure	193
194. Haftung	194
195. Sonstiges	195
196. Impressum	196
197. Verlagsinformation	197
198. Kontakt	198
199. Copyright	199
200. Druck	200
201. Papier	201
202. Bindung	202
203. Preis	203
204. Bestellen	204
205. Versand	205
206. Retoure	206
207. Haftung	207
208. Sonstiges	208
209. Impressum	209
210. Verlagsinformation	210
211. Kontakt	211
212. Copyright	212
213. Druck	213
214. Papier	214
215. Bindung	215
216. Preis	216
217. Bestellen	217
218. Versand	218
219. Retoure	219
220. Haftung	220
221. Sonstiges	221
222. Impressum	222
223. Verlagsinformation	223
224. Kontakt	224
225. Copyright	225
226. Druck	226
227. Papier	227
228. Bindung	228
229. Preis	229
230. Bestellen	230
231. Versand	231
232. Retoure	232
233. Haftung	233
234. Sonstiges	234
235. Impressum	235
236. Verlagsinformation	236
237. Kontakt	237
238. Copyright	238
239. Druck	239
240. Papier	240
241. Bindung	241
242. Preis	242
243. Bestellen	243
244. Versand	244
245. Retoure	245
246. Haftung	246
247. Sonstiges	247
248. Impressum	248
249. Verlagsinformation	249
250. Kontakt	250
251. Copyright	251
252. Druck	252
253. Papier	253
254. Bindung	254
255. Preis	255
256. Bestellen	256
257. Versand	257
258. Retoure	258
259. Haftung	259
260. Sonstiges	260
261. Impressum	261
262. Verlagsinformation	262
263. Kontakt	263
264. Copyright	264
265. Druck	265
266. Papier	266
267. Bindung	267
268. Preis	268
269. Bestellen	269
270. Versand	270
271. Retoure	271
272. Haftung	272
273. Sonstiges	273
274. Impressum	274
275. Verlagsinformation	275
276. Kontakt	276
277. Copyright	277
278. Druck	278
279. Papier	279
280. Bindung	280
281. Preis	281
282. Bestellen	282
283. Versand	283
284. Retoure	284
285. Haftung	285
286. Sonstiges	286
287. Impressum	287
288. Verlagsinformation	288
289. Kontakt	289
290. Copyright	290
291. Druck	291
292. Papier	292
293. Bindung	293
294. Preis	294
295. Bestellen	295
296. Versand	296
297. Retoure	297
298. Haftung	298
299. Sonstiges	299
300. Impressum	300

Meinen Eltern in Dankbarkeit
gewidmet



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. <u>Einleitung</u>	1
B. <u>Methodik</u>	3
1. Bakterienstämme	3
2. Züchtung	3
3. Versuchsbedingungen	6
C. <u>Ergebnisse</u>	14
1. Übersicht über die bei 47 Bakterienstämmen aus den Ordnungen Pseudomonadales, Eubacte- riales und Actinomycetales gefundenen Reaktionen	14
2. Einfluß der Inkubationsdauer auf das Reaktionsergebnis	17
3. Der Abbau der einzelnen Stoffklassen	20
a) Kohlenhydrate	20
b) Carbonsäuren	21
c) Glycoside	22
d) Aminosäuren	24
e) Substrate der Esterasen und Lipasen	24
f) Substrate der Phosphatasen	25
D. <u>Besprechung</u>	26
1. Problematik der Methode zur biochemischen Differenzierung von Bakterien	26
2. Aussagekraft der einzelnen Testmöglichkeiten	27
E. <u>Zusammenfassung</u>	30
F. <u>Literatur</u>	31

A. Einleitung

Die biochemischen Leistungen der Bakterien sind sowohl für die Keimdifferenzierung der medizinischen Diagnostik als auch für die technische Mikrobiologie von größtem praktischen Interesse und auch von großer Bedeutung für viele Forschungsgebiete, z.B. die Bakterienphysiologie und Genetik. Aus den genannten Gründen ist eine möglichst umfassende biochemische Charakterisierung der Keime wünschenswert. Hinzu kommt die Notwendigkeit, die Differenzierungsverfahren zu beschleunigen, um schneller mit dem Beginn therapeutischer und prophylaktischer Maßnahmen im Rahmen der Seuchenbekämpfung einsetzen zu können. Gerade in den letzten Jahren sind zahlreiche Methoden zur Vereinfachung und Beschleunigung der mikrobiologischen Diagnostik angegeben worden (siehe z.B. 1 - 26).

Die zur Differenzierung heute gebräuchlichen Verfahren bestehen darin, daß die isolierten Keime in dazu vorbereitete Mangelnährmedien geimpft werden. Diese Medien enthalten Zusätze wie Zucker, Alkohole, Harnstoff, Säuren oder Nitrat u.a. Gleichzeitig mit der Bakterienvermehrung wird der Abbau dieser speziellen Zusätze beobachtet.

Von diesem Verfahren unterscheiden sich die nachfolgenden Untersuchungen dadurch, daß ausschließlich mit nichtproliferierenden Keimen in einfach zusammengesetzten Medien, die lediglich das Substrat in Pufferlösung enthalten, gearbeitet wird.

Untersuchungen mit nichtproliferierenden Keimsuspensionen

sind bereits von verschiedenen Autoren (5, 7, 8, 14, 20, 24 - 28) beschrieben worden. Diese Verfahren unterscheiden sich wesentlich von den allgemein üblichen der sogenannten "Bunten Reihe", bei der in komplexen Nährmedien alle Stadien der bakteriellen Entwicklung durchlaufen werden. Hierbei kann das Medium durch Stoffwechselvorgänge durchgreifend verändert werden.

Bei der Prüfung biochemischer Leistungen nichtproliferierender, gewaschener Keimsuspensionen wird in einem definierten Nährmilieu unter reproduzierbaren Bedingungen gearbeitet. Der Abbau eines Substrates läßt sich in eindeutiger Weise entweder an der Bildung farbiger Reaktionsprodukte, durch Farbänderung eines Indikators oder durch Nachweis eines definierten Abbauproduktes erkennen.

Es ist anzunehmen, daß bei diesem Verfahren die Permeabilität der Zellmembran gegenüber den verschiedenen angebotenen Substraten eine größere Rolle spielt als bei der biochemischen Prüfung sich vermehrender, wachsender Mikroorganismen in komplexen Medien.

In den folgenden Untersuchungen werden z.T. erstmals biochemische Reaktionen mit Kohlenhydraten, Alkoholen, Glykosiden, organischen Säuren und Substraten von Esterasen, Lipasen und Phosphatasen an nichtproliferierenden Keimsuspensionen durchgeführt. Das wichtigste Ziel dieser Arbeit besteht darin, Erfahrungen über die Brauchbarkeit derartiger Reaktionen für die bakterielle Diagnostik zu sammeln.

Die vorliegenden Untersuchungen beschränken sich auf einige, vom medizinischen Standpunkt aus interessante Bakterienstämme aus verschiedenen Ordnungen und Familien.

B. Methodik

1. Bakterienstämme

Die Bakterienstämme sind mit ihren Bezeichnungen und Sammlungsnummern sowie den zu ihrer Anzucht verwendeten Nährmedien in Tabelle 1 zusammengestellt. Die Keime stammen aus der Stammsammlung des Hygiene-Institutes der Universität Marburg.

2. Züchtung

Die verwendeten Bakterienkulturen sind in der Regel auf Trypticase Soy Agar (Baltimore Biological Laboratory, Inc.) konserviert und bei Bedarf auf Blutagar abgeimpft worden. Die Keime wurden für die Untersuchungen in den in Tabelle 1 angegebenen Medien (30 ml-Mengen in 50 oder 100 ml-Erlenmeyerkolben mit Watteverschluß und Zinnkappenfolie) ca. 12 Stunden unbewegt bei 37°C gezüchtet. Vor der Ernte erfolgte zur Kontrolle auf ihre Reinheit eine Aussaat auf Blutagar. Die Keime wurden dann aus der Nährlösung abzentrifugiert (5 Minuten lang bei 15000 g), anschließend zweimal mit 9,9%iger Kochsalzlösung durch wiederholtes Zentrifugieren gewaschen und in physiologischer Kochsalzlösung suspendiert. Nach nephelometrischer Messung der Keimdicke mit Hilfe von Eichkurven am Eppendorff-Photometer bei 578 mμ wurde die Keimsuspension auf 4-8 mg Trockengewicht/ml eingestellt (5, 24). Für jeden Versuchsansatz sind 0,3 ml dieser Keimsuspension erforderlich.

Tabelle 1

Bakterienstämme:	Sammlungs-Nr. H I M	Medium
=====	=====	=====
1) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	108-2	Tr.Soy Br.
2) <i>Pseudomonas fluorescens</i>	108-1	Tr.Soy Br.
3) <i>Pseudomonas putida</i>	74-3	Tr.Soy Br.
4) <i>Aeromonas hydrophila</i>	76-2	Tr.Soy Br.
5) <i>Spirillum volutans</i>	111-1	PP-Glu
6) <i>Vibrio comma</i>	66-1	Tr.Soy Br.
7) <i>Chromobacterium violaceum</i>	112-1 (2076 CCM)	Tr.Soy Br.
8) <i>Achromobacter mucosus</i>	21-1 (10303 NCTC)	Tr.Soy Br.
9) <i>Achromobacter haemolyticus</i> (Subsp.haemolyticus)	22-2 (10305 NCTC)	Tr.Soy Br.
10) <i>Achromobacter haemolyticus</i> (subsp.alcaligenes)	23-1 (10306 NCTC)	Tr.Soy Br.
11) <i>Achromobacter metalcaligenes</i>	47-1	Tr.Soy Br.
12) <i>Flavobacterium sp.</i>	48-3	Tr.Soy Br.
13) <i>Escherichia coli</i> (O 86)	16-4	Tr.Soy Br.
14) <i>Salmonella typhimurium</i>	39-1	Tr.Soy Br.
15) <i>Citrobacter freundii</i>	35-5	Tr.Soy Br.
16) <i>Klebsiella pneumoniae</i>	108-5	Tr.Soy Br.
17) <i>Serratia marcescens</i>	32-3	Tr.Soy Br.
18) <i>Proteus vulgaris</i>	108-4	Tr.Soy Br.
19) <i>Pasteurella pseudotuberculosis</i> (Typ III)	71-3	Tr.Soy Br.
20) <i>Pasteurella multocida</i> (Typ D CARTER)	51-5	Tr.Soy Br.
21) <i>Bordetella bronchiseptica</i>	14-2	Tr.Soy Br.
22) <i>Haemophilus influenzae</i>	111-2	PP-Glu-Hae-NAD
23) <i>Haemophilus aegyptius</i>	116-8	PP-Glu-Hae-NAD

Bakterienstämme:	Sammlungs-Nr.	Medium
	H I M	
24) <i>Brucella suis</i>	48-5	Tr.Soy Br. + PP - Glu
25) <i>Moraxella nonliquefaciens</i>	87-5	Tr.Soy Br.
26) <i>Bacteroides</i> sp.	117-3	Tr.Soy Br. + Tar
27) <i>Staphylococcus aureus</i>	44-1	Tr.Soy Br.
28) <i>Staphylococcus epidermidis</i>	104-7	Tr.Soy Br.
29) <i>Micrococcus</i> sp.	109-3	Tr.Soy Br.
30) <i>Sarcina</i> sp.	65-1	Tr.Soy Br.
31) <i>Neisseria catarrhalis</i>	108-6	P P
32) <i>Neisseria meningitidis</i>	63-4	P P - Glu
33) <i>Veillonella parvula</i>	109-6	P P - Glu
34) <i>Diplococcus pneumoniae</i> (Typ III)	111-4 (7978 NCTC)	P P - Glu
35) <i>Streptococcus faecalis</i>	109-2	P P - Glu
36) <i>Peptostreptococcus</i> sp.	117-1	P P+Glu+Tar
37) <i>Corynebacterium diphtheriae</i>	55-5	Tr.Soy Br. + P P - Glu
38) <i>Corynebacterium xerosis</i>	109-4	Tr.Soy Br.
39) <i>Listeria monocytogenes</i> (Typ 2)	58-4	Tr.Soy Br.
40) <i>Erysipelothrix insidiosa</i> (Typ B)	103-2	P P - Glu
41) <i>Arthrobacter pascens</i>	82-1 (8910 NCIB)	Tr.Soy Br.
42) <i>Bacillus cereus</i>	52-6 (8035 ATCC)	Tr.Soy Br.
43) <i>Bacillus subtilis</i>	51-3 (6633 ATCC)	Tr.Soy Br.
44) <i>Clostridium</i> sp.	120-2	Thioglyco- latbouillon
45) <i>Clostridium tetani</i>	117-2	P P - Glu
46) <i>Nocardia asteroides</i>	110-7	Tr.Soy Br.
47) <i>Mycobacterium phlei</i>	32-3	Tr.Soy Br. + P P - Glu

Medien:

Tr.Soy Br. = Trypticase Soy Broth (Baltimore Biological Laboratory)

P P = Proteose peptone No. 3 (Difco Laboratories)
2 %;
NaCl 0,6 %; Tris(hydroxymethyl)-amino-
methan q.s. pH 7,4;
Glucose (= Glu) (separat sterilisiert)
0,25 %;
Zusätze: Hae = Hämin 0,5 ug/ml;
NAD 1,0 ug/ml

Thioglycolat = Thioglycolatmedium mit Glucose
(Baltimore Biological Laboratory)

Tar = Leberbouillon nach Tarozzi

3. Versuchsbedingungen

Die Untersuchungen erfolgten nach dem von BÜRGER (24 -26) beschriebenen Verfahren, wobei die oben angegebene Keimsuspension mit gleichem Volumen einer Substratlösung zusammengegeben und anschließend bei 37°C inkubiert wurde.

Eine Übersicht über die Reaktionsbedingungen und die in den einzelnen Reaktionen nachgewiesenen Spaltprodukte enthält Tabelle 2 (24-26). Mit Ausnahme derjenigen Reaktionen, bei denen eine Gasentwicklung beobachtet werden mußte, wurden alle Untersuchungen in sterilen Reagenzgläsern ausgeführt.

Zur Beobachtung der CO₂-Entwicklung aus D-Glucose, D(-)-Mannit und Natriumformiat, der Ammoniakbildung aus Harnstoff

sowie der Schwefelwasserstoffbildung aus L(+)-Cystein und L(-)-Cystin ist eine von BÜRGER (24) eigens hierfür entwic=
wickelte Kammer benutzt worden.

Alle Ansätze sind doppelt angelegt und durch Kontrollen,
die lediglich das Substrat enthielten, sowie positive Ver=
gleichswerte gesichert worden.

Ogbleich die Versuchsordnung völlig steriles Arbeiten nicht
erfordert, wurde am Ende der Beobachtungszeit, vor Zugabe
der Nachweisreagenzien, eine Reinheitskontrolle an minde=
stens 10 willkürlich ausgewählten Ansätzen durch Aussaat
auf Blutagar durchgeführt.

Die Versuchsdauer betrug in allen Fällen, in denen ein ge=
sonderter Nachweis der Spaltprodukte erforderlich war, 4
bis maximal 6 Stunden. War nach 4 Stunden der Reaktionsaus=
fall in einem Ansatz negativ, so wurde im Parallelansatz
der Nachweis erst nach 6 Stunden wiederholt.

In allen Fällen, in denen aus den Substraten farbige Spalt=
produkte entstanden oder pH-Verschiebungen Indikatorum=
schläge verursachten oder Gasbildung eintrat, wurden die
Ansätze bis zu 3 Stunden alle 30 Minuten und danach stünd=
lich bis zur 6. Stunde kontrolliert.

Tabelle 2

Substratlösungen:

Nachweisreaktionen:

Kohlenhydrate:

L(+)Arabinose ($2 \times 10^{-1} \text{m}$),
D-Ribose ($2 \times 10^{-1} \text{m}$),
D(+)Xylose ($2 \times 10^{-1} \text{m}$),
D(-)Fructose ($1,67 \times 10^{-1} \text{m}$),
D(+)Galactose ($1,67 \times 10^{-1} \text{m}$),
D - Glucose ($1,67 \times 10^{-1} \text{m}$),
D - Mannose ($1,67 \times 10^{-1} \text{m}$),
L(+)Rhamnose ($1,83 \times 10^{-1} \text{m}$),
L-Sorbose ($1,67 \times 10^{-1} \text{m}$),
D(+)Lactose ($8,7 \times 10^{-1} \text{m}$),
Maltose ($8,7 \times 10^{-2} \text{m}$),
D(+)Saccharose ($8,7 \times 10^{-2} \text{m}$),
d-(+)Trehalose ($8,7 \times 10^{-2} \text{m}$),
Raffinose ($6 \times 10^{-2} \text{m}$),

in m/300 P-p, pH 7,4 mit

Bromthymolblauzusatz

Säurebildung bewirkt
Indikatorumschlag
von blau nach gelb

Alkohole:

Glycerin ($1,1 \times 10^{-1} \text{m}$),
Adonit ($1,97 \times 10^{-1} \text{m}$),
Dulcit ($1,65 \times 10^{-1} \text{m}$),
meso-Inosit ($1,67 \times 10^{-1} \text{m}$),
D(-)Mannit ($1,65 \times 10^{-1} \text{m}$),
D(-)Sorbit ($1,65 \times 10^{-1} \text{m}$)

in m/300 P-p, pH 7,4 mit

Bromthymolblauzusatz

Säurebildung bewirkt
Farbumschlag von
blau nach gelb

Substratlösungen:

Nachweisreaktionen:

Carbonsäuren:

Natriumformiat ($1,5 \times 10^{-1} \text{ m}$),
Natriumcitrat ($5,1 \times 10^{-3} \text{ m}$),
Natriummalonat ($1,2 \times 10^{-2} \text{ m}$),
Natriummucat ($6,2 \times 10^{-3} \text{ m}$),
Natrium-d(-)tartrat ($6,5 \times 10^{-3} \text{ m}$),
in P-p mit NaOH auf pH 5,6
eingestellt und Bromthymol=
blauzusatz als Indikator

Bei Alkalisierung
Indikatoriumschlag
von gelb nach blau

Gasbildung aus:

Natriumformiat ($5,9 \times 10^{-1} \text{ m}$),
in m/150 P-p, pH 6,0
D - Glucose ($1,67 \times 10^{-1} \text{ m}$),
D(-)Mannit ($1,65 \times 10^{-1} \text{ m}$),
in m/300 P-p, pH 7,4
Harnstoff ($1,67 \times 10^{-1} \text{ m}$)
in m/15 P-p, pH 7,2

Gasblasen

Gasblasen

L(+)Cystein ($4,95 \times 10^{-1} \text{ m}$),
L(-)Cystin ($1,25 \times 10^{-2} \text{ m}$)

Ammoniak bewirkt
Farbumschlag des
Indikators Phenol=
rot von gelb nach
rot

H₂S bewirkt Schwär=
zung durch PbS-
Bildung

Aminosäuren:

L-Arginin ($1,15 \times 10^{-1} \text{ m}$),
L-Lysin ($1,38 \times 10^{-1} \text{ m}$),
L-Ornithin ($1,52 \times 10^{-1} \text{ m}$)
in wäßriger Lösung auf
pH 6,0 eingestellt

Alkalisierung bewirkt
Farbumschlag des In=
dikatorgemisches
(Bromkresolpurpur
und Kresolrot) von
gelb n.rot-violett

Substratlösungen:

- 10 -

L-Phenylalanin

bei 40°C gesättigte
wäßrige Lösung mit n/10
NaOH auf pH 7,2 eingestellt

D,L-Tryptophan

bei 40°C gesättigte wäßri-
ge Lösung mit n/10 NaOH
auf pH 7,2 eingestellt

Kaliumnitrat ($1 \times 10^{-1} \text{ m}$)

mit n/100 NaOH auf pH 7,2
eingestellt

Glycoside:

Aesculin

a) halbgesättigte wäßrige
Lösung in m/300 P-p,
pH 7,4 mit Bromthymol-
blauzusatz

b) halbgesättigte wäßrige
Lösung in 0,5m P-p,
pH 7,4

p-Arbutin ($2,2 \times 10^{-1} \text{ m}$)

a) in m/300 P-p, pH 7,4
mit Bromthymolblauzu-
satz

Nachweisreaktionen:

Phenylbrenztrauben-
säure gibt mit Fe-
III-Salzen grüne-
färbte Komplexe

a) Indolbrenztrauben-
säure gibt mit Fe-
III-Salzen einen
rotgefärbten Kom-
plex

b) Indolnachweis
durch Kondensation
mit p-Dimethylami-
nobenzaldehyd
(Rotfärbung)

Nitrit färbt sich mit
Sulfanilsäure und a-
Naphthylamin rot

Säurebildung bewirkt
Indikatorumschlag von
blau nach gelb

6,7-Dihydroxycumarin
gibt mit Ferricitrat
eine Braunfärbung

Säurebildung bewirkt
Indikatorumschlag
von blau nach gelb

Substratlösungen:

b) in 0,5m P-p, pH 7,4

D-Salicin (wäßrige, bei 40°C
gesättigte Lösung)

a) in m/3000 P-p, pH 7,4
mit Bromthymolblauzusatz

b) in 0,5m P-p, pH 7,4

6-Brom-2-naphthyl-β-D-galacto-
pyranosid ($7,8 \times 10^{-4}$ m)

in 0,5m P-p, pH 7,0

o-Nitrophenyl-β-D-galacto-
pyranosid (1×10^{-3} m)

in T-p(J=0,1), pH 7,2

Indoxyl-β-D-glucosid
($1,75 \times 10^{-3}$ m)

in 0,2m P-p, pH 8,0

Phenolphthaleinglucuronid
($1,95 \times 10^{-4}$ m)

in Acet-p, pH 5,4

Nachweisreaktionen:

Phloroglucin gibt mit
Hydrochinon eine Rot=
färbung

Säurebildung bewirkt

Indikatorumschlag

von blau nach gelb

o-Hydroxybenzylalkohol
bildet mit 4-Amino=
antipyrin eine rotge=
färbte, mit 2,6-Di=
bromchinon-4-chlorimid
eine blaugefärbte
Verbindung

β-Naphthol kuppelt mit
diazotiertem o-Diani=
sidin zu einem rot=
braunen Farbstoff.
4-Aminoantipyrin gibt
mit β-Naphthol eine
Grünfärbung.

p-Nitrophenol ist in
alkalischer Lösung
gelb gefärbt

Indoxyl wird durch
Luftsauerstoff in al=
kalischer Lösung zu
Indigo oxydiert

Phenolphthalein färbt
sich in alkalischer
Lösung rot

Substratlösungen:

Substrate der Esterasen und Lipasen:

a-Naphthylacetat ($1,07 \times 10^{-3} \text{m}$),

Naphthol-AS-acetat ($6,6 \times 10^{-4} \text{m}$)

in P-p (J=0,05), pH 7,4

Indoxylacetat ($2,3 \times 10^{-3} \text{m}$),

Indoxylbutyrat ($1,95 \times 10^{-3} \text{m}$)

in 0,1m T-p, pH 8,5

Caprylsäure- β -naphthylester

($1,83 \times 10^{-3} \text{m}$),

Laurinsäure- β -naphthylester

($1,53 \times 10^{-3} \text{m}$)

suspendiert in P-p,

(J=0,05), pH 7,4

p-Nitrophenyllaurat

($1,56 \times 10^{-3} \text{m}$),

p-Nitrophenylmyristat

($1,43 \times 10^{-3} \text{m}$)

suspendiert in 0,2m P-p,

pH 7,4

Nachweisreaktionen:

Freiwerdendes a- bzw. β -Naphthol wird entweder mit Naphthionsäure zu einem roten Farbstoff gekuppelt oder durch Farbreaktion mit 4-Aminoantipyrin (a-Naphthol ergibt Rotfärbung, β -Naphthol Blau-Grünfärbung) nachgewiesen.

Indoxyl wird in alkalischer Lösung durch den Luftsauerstoff zu Indigo oxydiert.

4-Aminoantipyrin ergibt mit β -Naphthol eine Blau-Grün-Färbung.

p-Nitrophenol färbt sich in alkalischer Lösung gelb

Substratlösungen:

Nachweisreaktionen:

Substrate der Phosphatasen:

di-Na-phenylphosphat

($4,6 \times 10^{-3} \text{m}$)

in Carb-p, pH 9,3

2,6-Dibromchinon-4-

chlorimid gibt mit

Phenol in alkalischer

Lösung eine Blaufär-

bung

a-Naphthylphosphat ($1,22 \times 10^{-3} \text{m}$)

a) in Acet-p, pH 5,2

b) in T-p, pH 8,3

a-Naphthol lässt sich

mit diazotiertem

Naphthionat zu einem

roten Farbstoff kup-

pelm

p-Nitrophenylphosphat

($6,47 \times 10^{-3} \text{m}$)

a) in Gly-p, pH 10,5

b) in Cit-p, pH 4,8

p-Nitrophenol färbt

sich in alkalischer

Lösung gelb

Phenolphthaleindiphosphat

($1,25 \times 10^{-4} \text{m}$),

Phenolphthalein ist

in alkalischer Lösung

rot gefärbt

Colaminphenolphthaleindi-

phosphat ($1,39 \times 10^{-4} \text{m}$)

a) in Acet-p, pH 5,4

b) in V-p, pH 9,7

Erläuterungen zu Tabelle 2:

P-p : Phosphatpuffer

T-p : Trishydroxymethylaminomethanpuffer

Acet-p : Acetatpuffer

Gly-p : Glycinpuffer

Carb-p : Carbonatpuffer

Cit-p : Citratpuffer

V-p : Veronalpuffer

C. Ergebnisse

1. Übersicht über die bei 47 Bakterienstämmen aus den Ordnungen Pseudomonadales, Eubacteriales und Actinomycetales gefundenen Reaktionen

Die Versuchsergebnisse sind in den Tabellen 3a, b zusammengestellt. Alle Substrate, mit denen keine, und alle, mit denen stets positive Ergebnisse registriert werden konnten, sind nicht in der Tabelle enthalten, weil sie eine Differenzierung nicht ermöglichen. Folgende Substrate wurden von keinem der untersuchten Bakterienstämme angegriffen:

Natriummucic und Natrium-d-(-)-tartrat (Alkalisierung), Indoxylsulfat, L-Cystin-di- β -naphthylamid (H_2S -Bildung) sowie Naphthol-AS-acetat. Dagegen wurde α -Naphthylacetat von allen untersuchten Bakterienarten gespalten.

Alle Ergebnisse wurden zur Auswertung auf Lochkarten übertragen. Sie zeigte, daß sich alle geprüften Keime durch ihre biochemischen Leistungen unterscheiden lassen.

Die allen Vertretern einer Keimgruppe gemeinsamen Reaktionen sowie alle Fälle, in denen eine Stoffklasse (z.B. Alkohole, Carbonsäuren u.a.) von den Bakterienstämmen einer Keimgruppe nicht angegriffen worden sind, wurden in den Tabellen 4a, b zusammengestellt.

Aus den Tabellen 4a, b geht hervor, daß sich die untersuchten Keimgruppen voneinander unterscheiden lassen. Ferner ist ersichtlich, daß einige Keimfamilien unter den gegebenen Bedingungen nicht in der Lage waren, die angebotenen Alkohole, Carbonsäuren, die Aminosäuren L-Phenylalanin und D,L-Ornithin zu Phenylbrenztraubensäure bzw. Indolbrenztraubensäure

Plutonium-239

- + = positiver Reaktionsausfall
- = negativer Reaktionsausfall
- (+) = unklarer Befund

(+) = unklarer Befund
Zahlen = Inkubationsdauer in Minuten. In allen anderen Fällen betrug die Inkubationszeit 6 Stunden.

Date	1900	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

oder Indol abzubauen. Manche vermochten auch nicht die Aminosäuren L-Arginin, L-Lysin und D,L-Ornithin zu decarboxylieren oder Nitrat zu reduzieren.

Auffällig heben sich in den Tabellen 4a, b die Enterobacteraceen gegenüber den anderen Keimfamilien ab.

2. Einfluß der Inkubationsdauer auf das Reaktionsergebnis

Die maximale Versuchsdauer betrug 6 Stunden (24).

In jeder der untersuchten Stoffklassen fanden sich aber einige Reaktionen, bei denen das positive Ergebnis an Farbbänderungen ohne nachträgliche Reagenzienzugabe ablesbar war, da Substrat und Indikator bereits im Ansatz vorhanden waren (Tabelle 2). Hieraus ist zu entnehmen, daß in solchem Fall die Reaktion weniger als 4 Stunden benötigt.

Weiteres Abwarten (wenn z.B. nach 4 Stunden bei der Ausführung der Kupplungsreaktionen der Reaktionsausfall negativ war) führt nach 6 Stunden weder zu einem positiven oder stärker positiven Ergebnis.

Zum Nachweis der Säurebildung aus Alkoholen und den Glycosiden Aesculin, p-Arbutin und Salicin waren etwa 6 Stunden erforderlich. Der Abbau von Kohlenhydraten unter Säurebildung war in vielen Fällen erst nach 4 Stunden am Umschlag des Indikators Bromthymolblau von blau-grün über grün, hellgrün nach gelb zu beobachten.

In vielen Fällen wurden die Ansätze (Kohlenhydrate, Alkohol) bei fehlendem Indikatorumschlag bis zu 8 Stunden beobachtet, ohne daß das nach 4 Stunden festgestellte Ergebnis revidiert werden mußte. Eine Rückkalkalisierung war also nicht zu beobachten.

Tabelle 4a

Übereinstimmende Reaktionsergebnisse
innerhalb der einzelnen Bakteriengruppen

Substrate	Pseudomonadales	Eubacteriales								Actinomycetales
		Achromobacteriaceae	Enterobacteriaceae	Brucellaceae	Micrococcaceae	Neisseriaceae	Lactobacillaceae	Corynebacteriaceae	Bacillaceae	
KNO ₃ (Reduktion zu Nitrit)	o	-	+	o	o	o	-	o	o	+
D(-)Fructose (Säurebildung)	o	o	+	o	o	-	o	o	o	o
D-Glucose (Säurebildung)	o	o	+	o	o	o	+	o	o	+
Glycerin, Adonit, Dulcit, meso-Inosit, D(-)-Mannit, D(-)-Sorbit	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-
Aesculin, p-Arbutin, D-Salicin, 6-Brom-2-naphthyl-β-D-galactopyranosid, p-Nitrophenyl-β-D-galactopyranosid, Phenolphthaleinglucuronid	o	-	o	o	o	-	o	o	o	o
Indoxyl-β-D-glucosid	o	o	+	o	o	-	+	o	o	o
Natriumformiat (Alkalisierung)	o	o	+	o	o	-	-	-	o	o
Natriumcitrat, Natriummalonat, Natriummucic, Natrium-d(-)-tartrat	o	o	o	o	-	-	-	-	-	o
L(+)-Cystein (H ₂ S-Bildung)	o	o	o	o	o	+	o	o	o	+
L-Phenylalanin (Phenylbrenztraubensäurebildung)	o	-	o	-	-	-	-	-	-	-

Substrate	Pseudomonadales	Eubacteriales							Actinomycetales	
		Achromobacteriaceae	Enterobacteriaceae	Brucellaceae	Micrococcaceae	Neisseriaceae	Lactobacillaceae	Corynebacteriaceae		Bacillaceae
D,L.Tryptophan										
a) (Indolbrenz- traubensäure- bildung)	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-
b) (Indolbildung)	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-
L(+)-Arginin (Di- hydrolysierung)	o	o	o	-	o	-	-	o	o	o
L(+)-Lysin (Decar- boxylierung)	o	-	o	o	-	-	-	-	-	o
L-Ornithin (Decar- boxylierung)	-	-	o	o	-	-	-	-	-	o
p-Nitrophenyllaurat	+	+	o	o	+	+	+	+	+	+
p-Nitrophenylmyris- tat	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+
a-Naphthylphosphat (pH 5,2 und pH 8,3)	o	o	+	o	o	o	o	o	+	o
Phenolphthaleindi- phosphat (pH 5,4)	o	+	+	+	o	o	+	+	o	o
p-Nitrophenylphos- phat (pH 10,5)	o	o	+	o	o	o	+	o	+	o

Zeichenerklärung:

- + = positiver Reaktionsausfall bei
allen Keimen einer Bakteriengruppe
- = negativer Reaktionsausfall bei
allen Keimen einer Bakteriengruppe
- o = positive und negative Reaktions-
ergebnisse innerhalb der einzelnen
Bakteriengruppen

Der Abbau der Aminosäuren L-Arginin, L-Lysin und D,L-Ornithin erfolgte gewöhnlich in 2 - 3 Stunden.

Den größten Zeitbedarf benötigten die Ansätze, bei denen der Abbau der Carbonsäuren eine Alkalisierung bewirken sollte. Nur Natriumformiat wird schneller abgebaut.

Aus den Ergebnissen ist zu folgern, daß eine Versuchsdauer von 4 Stunden in den meisten Fällen ausreicht.

In den nach 6 Stunden aus den Versuchsansätzen zur Reinheitskontrolle entnommenen Proben (Ausstriche auf Blutagar und mikroskopische Untersuchung) ließen sich keine oder nur selten spärlich bakterielle Verunreinigungen nachweisen. In keinem Fall mußten Versuche wegen aerogener Kontaminationen durch Fremdkeime wiederholt werden.

3. Der Abbau der einzelnen Stoffklassen

a) Kohlenhydrate und Alkohole:

Bei dem Versuch, die Säurebildung aus Kohlenhydraten und Alkoholen zu beurteilen, traten vereinzelt Unsicherheiten dadurch auf, daß Bakterien den Indikatorfarbstoff reduzierten oder der Indikator lediglich bis zu hellgrün umschlug. Die erste Schwierigkeit ließ sich leicht durch Hinzutropfen von Indikatorlösung am Ende des Versuches beheben.

Lag eine helle Grünfärbung vor, so wurde auf die Färbung des Vergleichswertes mit $n/100$ NaOH zurücktitriert und danach entschieden, ob Säurebildung aus dem Substrat erfolgt war. Alle Substrate waren so eingestellt, daß höchstens 3 Tropfen $n/100$ HCl einen Farbumschlag von blau nach gelb bewirken konnten. Die Säurebildung wurde angenommen, wenn mehr

als 5 Tropfen n/100 NaOH notwendig waren, um die Ausgangsfärbung der Suspension wieder zu erreichen. Die Reaktion wurde dann, gleichgültig, ob Säurebildung nachgewiesen werden konnte oder nicht, als negativ oder unsicher beurteilt, weil die Farbe des Indikators maßgebend für die Beurteilung sein soll. Der Befund "hellgrün" - trotz gut nachweisbarer Säurebildung - ist mit der Bildung von Puffern zu erklären.

Um Aufschluß über das unterschiedliche Verhalten beim Abbau von Zuckern und Alkoholen zu bekommen, wurden auch positive Ansätze grundsätzlich zurücktitriert. Es ließen sich stark unterschiedliche Säuremengen (äquivalent 3-20 Tropfen n/100 NaOH) bei gleichen Zuckern nachweisen.

Die Befunde deuten darauf hin, daß der Nachweis der Säurebildung durch Indikatorumschlag ein mehrdeutiges Kriterium für die Differenzierung ist. Weder können Stoffwechseltypen unterschieden noch Säurebildungen stets mit Sicherheit erkannt werden.

Die mögliche Rückalkalisierung würde ebenfalls störend wirken, da die Ansätze zur Vermeidung von Fehlurteilen mindestens jede Stunde kontrolliert werden müßten.

b) Carbonsäuren:

Natrium-mucat und Natrium-d(-)-tartrat wurden in keinem Falle abgebaut. Der Abbau von Natrium-formiat erfolgte ungleich schneller als der von -citrat. Citratabbau unter Alkalisierung wurde in 10 Fällen, Abbau von Natriumformiat in 19 Fällen beobachtet.

Säurebildung aus Glucose und gleichzeitige Gasbildung aus

Natrium-formiat wurden bei *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Citrobacter freundii*, *Klebsiella pneumoniae* und *Proteus vulgaris*, Gasbildung aus Glucose und aus Natrium-formiat wurden bei *Escherichia coli*, *Citrobacter freundii*, *Klebsiella pneumoniae* und *Proteus vulgaris* festgestellt, Gasbildung aus Glucose und Säurebildung aus Natrium-formiat kamen bei *Escherichia coli*, *Citrobacter freundii*, *Klebsiella pneumoniae* und *Proteus vulgaris*, Gas- und Säurebildung aus Glucose gleichzeitig bei *Escherichia coli*, *Citrobacter freundii*, *Klebsiella pneumoniae* und *Proteus vulgaris* zustande. Gasbildung aus Natrium-formiat ohne Säure- oder Gasbildung aus Glucose findet man bei *Achromobacter haemolyticus* (23-1).

Hieraus ist zu schließen, daß der Abbau von Glucose und Natrium-formiat nicht parallel gehen muß.

c) Glycoside

Der Abbau der Glycoside Aesculin, p-Arbutin und Salicin wurde in zweifacher Hinsicht kontrolliert, einerseits durch Beobachtung des Indikatorumschlages Bromthymolblau von blau nach gelb (Säuerung), andererseits durch direkten Nachweis der Spaltprodukte (6,7-Dihydroxycumarin, Hydrochinon, o-Hydroxybenzylalkohol). Spaltung und Säurebildung stimmten nicht immer überein, wie aus der Tabelle 5 zu ersehen ist. Die Differenzen könnten auf unterschiedlicher Empfindlichkeit des spezifischen Nachweises und der Indikatorreaktion, oder auch darauf beruhen, daß entweder nach der Spaltung keine Säurebildung erfolgt oder Säurebildung ohne Spaltung

23 -
Tabelle 5

	Aesculin	
	6,7-Dihydroxy- cumarin	Säurebildung
Pasteurella pseudo- tuberculosis	+	-
Aeromonas hydrophila	+	-
Serratia marcescens	+	-
Streptococcus faecalis	+	-
Nocardia asteroides	+	-
	p-Arbutin	
	Hydrochinon- Nachweis	Säurebildung
Salmonella typhi- murium	(+)	-
Klebsiella pneu- moniae	-	+
	D-Salicin	
	o-Hydroxyben- zylalkohol	Säurebildung
Salmonella typhi- murium	+	-
Citrobacter freun- dii	(+)	-
Serratia marcescens	+	-
Proteus vulgaris	+	-
Neisseria meningi- tidis	(+)	-
Diplococcus pneumo- niae	(+)	-
Streptococcus faecalis	(+)	-
Peptostreptococcus sp.	+	-
Clostridium tetani	+	-

eintritt. Eine Entscheidung hierüber setzt die Isolierung der Abbauprodukte voraus.

d) Aminosäuren:

Um die Spaltung der Aminosäuren L-Arginin, L-Lysin und L-Ornithin zu beobachten, wurde in den Ansätzen die Glucose fortgelassen. Damit war es möglich, eine Alkalisierung der Suspension auch dann zu erkennen, wenn Glucose nicht abgebaut wird. Beispiele hierfür sind die Dihydrolysisierung von L-Arginin durch *Arthrobacter pascens*, *Clostridium tetani* und *Nocardia asteroides*, ferner die Decarboxylierung von L-Lysin durch *Sarcina* sp. und *Nocardia asteroides*.

e) Substrate der Esterasen und Lipasen:

Während α -Naphthylacetat von allen Bakterien gespalten worden ist, war kein Keim zur Spaltung von Naphthol-AS-acetat in der Lage. Hierfür können nicht nur Permeabilitätsdifferenzen verantwortlich sein, sondern vor allem auch spezifische, enzymatische Unterschiede (40). Durch Wiederholung der Versuche mit homogenisierten Keimen könnte entschieden werden, ob Permeabilitätsschranken oder spezifische Enzymeigenschaften den Abbau von Naphthol-AS-acetat bestimmen.

Aus Tabelle 3a, b ist ersichtlich, daß Naphthylester schlechter angegriffen werden als Phenylester. Bei *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* und *Bordetella bronchiseptica* wurde beobachtet, daß als einziges Esterase-Substrat Caprylsäure- β -naphthylester abgebaut wird, nicht aber Indoxylacetat und Indoxylbutyrat. 12 Bakterienstämme spalten außer Caprylsäure-

β -naphthylester nur noch die höheren Fettsäureester der Laurin- und Myristinsäure.

Diese Befunde deuten darauf hin, daß Enzymspezifitäten mit Hilfe unterschiedlicher Substrate nachweisbar sind.

f) Substrate der Phosphatasen:

Saure Phosphatasen sind häufiger nachzuweisen als alkalische Phosphatasen. Am regelmäßigsten wird α -Naphthylphosphat (pH 5,2) gespalten.

Die Ergebnisse mit Colaminphenolphthaleindiphosphat sind nicht mit in die Tabelle 3a, b aufgenommen worden, weil da gegenüber Phenolphthaleindiphosphat niemals qualitative, jedoch in einigen Fällen reproduzierbare quantitative Unterschiede im Reaktionsausfall bestanden. So zeigten *Aeromonas hydrophila* und *Listeria monocytogenes* mit Colaminphenolphthaleindiphosphat eine stärkere positive Reaktion als mit Phenolphthaleindiphosphat, während sich *Serratia marcescens* umgekehrt verhielt.

D. Besprechung

1. Problematik der Methode zur biochemischen Differenzierung von Bakterien

Die untersuchten Bakterienstämme (Tabelle 1) ließen sich durch ihre biochemischen Leistungen unterscheiden. Würde man die in Tabelle 3a, b angegebenen einzelnen Reaktionen unter der Voraussetzung, daß sie beliebige gleichwertige Stoffwechselleistungen charakterisieren, variieren, so hätte man 2^n Unterscheidungsmöglichkeiten, die allerdings durch gruppiertes Vorkommen der zu unterscheidenden Enzyme stark reduziert würden.

Wenn deren Existenz nur Voraussetzung wäre, daß ihre Kombination nicht letal wirkt, läge der Gedanke nahe, daß solche Gruppierungen sich im System der Bakterien widerspiegeln müßten. Da Enzymmuster genetisch fixiert sind, ist das Vorkommen bakteriengruppenspezifischer Enzymkombinationen wahrscheinlich.

Sofern solche zur Charakterisierung einer ganzen Keimgruppe geeignete biochemische Leistungen im Rahmen dieser Arbeit überhaupt erfaßt wurden, müssen sie in der Tabelle 4a, b zu finden sein. Ob die dort zusammengestellten Unterschiede wirklich charakteristisch sind, kann erst nach Untersuchung einer großen Zahl von Stämmen jeder Keimgruppe entschieden werden. Setzt man voraus, daß die Unterschiede zwischen den Keimgruppen real sind, so ist ihnen bei der Differenzierung ein unterschiedliches Gewicht zuzuordnen. Gruppencharakteristische biochemische Kriterien zur Differenzierung wären somit höherwertig als solche, die zur Unterscheidung einzelner Stämme in der Gruppe dienen.

Über die Existenz gruppenspezifischer Enzymkombinationen findet man in der Literatur (z.B. 29 - 31) unterschiedliche Meinungen. Für die praktische Differenzierung ist man genötigt, höherwertige Kriterien anzunehmen, wie man es seit jeher tut, wenn man angibt, daß Bakterien z.B. kein Nitrat reduzieren, kein Gas aus Natriumformiat oder kein H_2S aus Cystein bilden. Umgekehrt findet man extrem häufige biochemische Leistungen, wie z.B. α -Naphthylacetat, das von allen hier untersuchten Keimen gespalten wurde. Dieses Verhalten könnte allerdings auch daran liegen, daß das Substrat extrem enzymspezifisch ist. Hierfür spricht (32), daß einige Naphthylester sogar durch Albumin spaltbar sein sollen. Ähnliches gilt möglicherweise für p-Nitrophenylphosphat (33, 34). Es wurde 43 mal bei der Prüfung auf saure Phosphatase (pH 4,8) und 34mal beim Nachweis alkalischer Phosphatase (pH 10,5) gespalten.

2. Aussagekraft der einzelnen Testmöglichkeiten

Die hier angewandten Methoden zur Differenzierung von Bakterien lassen sich nur zum Teil mit anderen bisher gebräuchlichen Differenzierungsverfahren vergleichen, weil viele Reaktionen mit proliferierenden Bakterien nicht untersucht worden sind und zum Teil auch nicht untersucht werden können, weil entweder die Stabilität der Substrate für eine so lange Versuchsdauer nicht ausreicht oder Störungen bei den Nachweisreaktionen durch das komplexe Medium auftreten können.

Die mit nichtproliferierenden Bakteriensuspensionen ausgeführten Tests zeichnen sich gegenüber denen der "Bunten Reihe"

dadurch aus, daß ein positiver Reaktionsausfall mit Sicherheit auf den Abbau eines bestimmten Substrates zurückzuführen ist, was in komplexen Medien nicht immer sicher beurteilt werden kann.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß unsteril gearbeitet werden kann. Die Stoffwechselaktivität von das Medium zufällig verunreinigenden aerogenen Fremdkeimen fällt gegenüber derjenigen einer Keimsuspension von durchschnittlich 6 mg/ml Trockensubstanz nicht ins Gewicht.

Stellt man die mit nichtproliferierenden Keimen nachgewiesenen biochemischen Leistungen denen mit proliferierenden Keimen gegenüber, so findet man, soweit es sich um den Abbau von Zuckern und Alkoholen handelt, bei den meisten Keimgruppen weitgehende Übereinstimmung (35 - 37).

Paralleluntersuchungen an proliferierenden und nichtproliferierenden Keimsuspensionen wurden an *M. mallei* ausgeführt (28) und ergaben Übereinstimmung beider Verfahren.

Unter der Voraussetzung gleicher Anzuchtbedingungen könnten im biochemischen Verhalten auftretende Unterschiede in engem Zusammenhang mit Wachstumsphasen (34, 38, 39), pH-, Redoxpotential- und Permeabilitätsänderungen stehen.

Abweichungen, die einige Keime (*Brucella suis*, *Actinobacillus lignieresii*, *Veillonella parvula*, *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus faecalis* und *Erysipelothrix insidiosa*) beim Abbau der Kohlenhydrate zeigten, mögen ihre Ursache darin haben, daß sie höhere Nährbodenansprüche haben, peroxydempfindlich sind, nur in engem Temperaturbereich wachsen und eine geringe Tenazität besitzen.

Es muß aber auch daran gedacht werden, daß diese Keime im

Kochsalzmilieu sehr rasch desintegrieren und daß ein Teil der Fermente durch autolytische Vorgänge zerstört wird. Für diese Keime scheint das Verfahren nicht geeignet zu sein. Das könnte auch für diejenigen Reaktionen gelten, bei denen es keine Vergleichsmöglichkeiten mit gebräuchlichen Testmethoden gibt.

E. Zusammenfassung

Das biochemische Verhalten nichtproliferierender Suspensionen von 47 verschiedenen Bakterienstämmen aus 12 Bakteriengruppen wurde gegenüber 66 Substraten untersucht.

Die geprüften Keime gehörten hauptsächlich den Eubacteriales an: Rhizobiaceae, Achromobacteriaceae, Enterobacteriaceae, Brucellaceae, Bacteriodaceae, Micrococcaceae, Neisseriaceae, Lactobacillaceae, Corynebacteriaceae, Bacillaceae. Außerdem wurden noch 6 Stämme aus der Ordnung Pseudomonadales und 2 Stämme aus der Ordnung Actinomycetales untersucht. Die verwendeten Substrate stammten aus folgenden Stoffklassen: Kohlenhydrate, Alkohole, Glycoside, Carbonsäuren, Aminosäuren, Ester von Carbonsäuren und Phosphorsäuren.

Ein Teil der hier geprüften Substrate ist erstmalig zur Differenzierung von Bakterien angewendet worden.

Es konnte gezeigt werden, daß eine biochemische Unterscheidung der Bakterien auch bei nichtproliferierenden Keimsuspensionen möglich ist. Die Befunde bei den Esterasen und Phosphatasen deuten darauf hin, daß sich verschiedene Enzymspezifitäten mit Hilfe einer größeren Zahl von Substraten ebenso analysieren lassen wie z.B. mittels selektiver Fermenthemmer.

Das Bürger'sche Kammer-system ermöglicht eine schnellere und umfassendere Keimanalyse als die bisherigen Verfahren, wobei eine Inkubationsdauer von 6 Stunden vollkommen ausreicht und geringfügige Kontaminationen nicht stören. Dadurch kann eine erregerspezifische Diagnose erleichtert und beschleunigt werden.

F. Literatur

1) KNOX, R.:

A screening plate for the rapid identification of faecal organisms.

J. Path. Bact. 61, 343-350 (1949)

2) SOTO, O.B.:

Fermentation reactions with dried paper discs containing carbohydrate and indicator.

Puerto Rico J. Publ. Health 25, 96-106 (1949)

3) HENRIKSEN, S.D.:

A comparison of the phenylpyruvic acid reaction and the urease test in the differentiation of proteus from other enteric organisms.

J. Bact. 60, 225-231 (1950)

4) HOYT, R.E.:

Tabletted substrates in the detection of indol and urease production by bacteria.

Amer. J. Clin. Path. 21, 892-893 (1941)

5) COWAN, S.T.:

Fermentation: Biochemical micromethods for bacteriology.

J. Gen. Microbiol. 8, 391-396 (1953)

6) SNYDER, M.L.:

Paper discs containing enteric culture medium for the differentiation of bacteria.

J. Path. Bact. 67, 217-226 (1954)

7) BOYD, W.L. and LICHSTEIN, H.C.:

The effect of carbohydrates on the tryptophanase activity of bacteria.

J. Bact. 69, 584-589 (1955)

8) SINGER, J. and VOLCANI, B.E.:

An improved ferric chloride test for differentiating proteus-providence group from other enterobacteriaceae.

J. Bact. 69, 303-306 (1955)

9) PICKETT, M.J., SCOTT, M.L. and HOYT, R.E.:

Tabletted medium for biochemical tests in diagnostic bacteriology.

Amer. J. Med. Techn. 21, 170-174 (1955)

- 10) HOYT, R.E. and PICKETT, M.J.:
Use of "rapid substrate" tablets in the recognition of enteric bacteria.
Amer. J. Clin. Path. 27, 343-353 (1957)
- 11) SANDERS, A.C., FABER, J.E. jr. and COOK, T.M.:
A rapid method for the characterisation of enteric bacteria using paper discs.
Appl. Microbiol. 7, 36-40 (1957)
- 12) COOK, T.M. and FELCZAR, M.J. jr.:
Detection of hydrogen sulfide production by bacteria using paper discs methods.
Appl. Microbiol. 6, 193-197 (1958)
- 13) PETERSEN, K.F. und ABU-GHAZALEH, J.:
Schnellmethode zur routinemäßigen Prüfung der biochemischen Leistungen der Enterobacteriaceen.
Zbl. Hyg. (Orig.) 146, 510-521 (1960)
- 14) HUET, M.:
L'urease et la lysine décarboxylase de Haemophilus influenzae et des espèces apparentées.
Arch. Inst. Pasteur Tunis 36, 29-35 (1959)
- 15) LANYI, B. and ADAM, M.M.:
Agar diffusion test and micromethods for the rapid biochemical differentiation of enteric bacteria.
Acta Microbiol. Acad. Sci. Hung. 7, 313-328 (1960)
- 16) ERLICH, H.:
A rapid semi-quantitative micro-spot plate technique for detecting small amounts of niacin in cultures of M. tuberculosis.
Amer. Rev. Resp. Dis. 86, 587-589 (1962)
- 17) KNOCHE, D.:
Über die Verwendung von substrat-indikatorhaltigen Filterpapierblättchen zur biochemischen Prüfung einiger Bakteriengruppen auf beliebigen festen Nährböden.
Inaugural Dissertation, Heidelberg, an der Med. Fak. der Ruprecht-Karl Univ. (1962)
- 18) HILL, G.A., FUNG, J. and MARCUS, S.:
A rapid test for proteus species.
J. Bact. 84, 191 (1962)

- 19) BERGQUIST, L.M. and SEARCY, R.L.:
A new micro fermentation technique for rapid detection of acid and gas.
Amer. J. Med. Techn. 28, 337-338 (1962)
- 20) EGLER, L. und TOTH, M.:
Biochemische Mikromethode zur Gruppenidentifizierung von Darmbakterien.
Zbl. Bakt. (Orig.) 189, 294-297 (1963)
- 21) BÜLOW, W.:
The ONPG-test in diagnostic bacteriology. 2. Comparison of the ONPG-test and the conventional lactose-fermentation test.
Acta Path. Microbiol. Scand. 60, 387-402 (1964)
- 22) GANDELMAN, A.L. and MANN, P.H.:
An evaluation of reagent-impregnated paper strips for use in the process of identifying certain species of clinically important bacteria.
Curr. Ther. Res. 7, 130-138 (1965)
- 23) MANN, P.H. and GANDELMAN, A.L.:
An evaluation of reagent-impregnated paper strips for use in the process of identifying certain species of clinically important bacteria. II. Testing for the producing of indol.
Curr. Ther. Res. 7, 510-512 (1965)
- 24) BÜRGER, H.:
Ein Verfahren zur Prüfung zahlreicher biochemischer Leistungen nichtproliferierender Bakterien, dargestellt am Beispiel der Enterobacteriaceen.
Zbl. Bakt. (Orig.) 196, 469-476 (1965)
- 25) BÜRGER, H.:
Biochemische Leistungen nichtproliferierender Mikroorganismen. II. Nachweis von Glycosid-Hydrolasen, Phosphatasen, Esterasen und Lipasen.
Zbl. Bakt. (Orig.) 202, 97-109 (1967)
- 26) BÜRGER, H.:
Biochemische Leistungen nichtproliferierender Mikroorganismen. III. Nachweis von Arylsulfatasen und Peptidasen.
Zbl. Bakt. (Orig.) 202, 395-401 (1967)

- 27) TARSHIS, M.S.:
A rapid 24-hour micro-phenolphthalein sulfatase test
for distinguishing *M. avium* from the unclassified
Battey Bacilli.
Acta Tuberc. Scand. 45, 221-229 (1964)
- 28) MANNHEIM, W. und BÜRGER, H.:
Über physiologische Merkmale und die Frage der systema-
tischen Stellung des Rotz-Erregers.
Z. med. Mikrobiol. u. Immunol. 152, 249-261 (1966)
- 29) SKINNER, C.E. and FLETCHER, D.W.:
A review of the genus *Candida*.
Bact. Rev. 23, 397-419 (1960)
- 30) ROBERTS, C. and THORNE, R.S.W.:
Biochemical classification of yeasts.
Nature 188, 872-873 (1960)
- 31) BARNETT, J.A.:
Biochemical classification of yeasts.
Nature 189, 76 (1961)
- 32) TOVE, S.B.:
Esterolytic activity of serum albumin.
Biochim. Biophys. Acta 57, 230-235 (1962)
- 33) ALDRIDGE, W.N.:
Serum esterases, 2. An enzyme hydrolysing diethyl-p-
nitrophenylphosphate (E 600) and its identity with the
A-esterase of mammalian sera.
Biochem. J. 53, 117-124 (1953)
- 34) ACKERMAN, G.A.:
Histochemical demonstration of aminopeptidase activity
in the leucocytes of blood and bone marrow.
J. Histochem. Cytochem. 8, 386 (1960)
- 35) BERGEY'S Manual of Determinative Bacteriology
The Williams Wilkins Company, Baltimore (1957)
- 36) KAUFMANN, F.:
Enterobacteriaceae
Ejnar Munksgaard Published, Copenhagen (1954)
- 37) EDWARDS, P.R. and EWING, W.H.:
Identification of Enterobacteriaceae
Burgess Publishing Company Minneapolis 15, Minnesota
(1962)

- 38) COHEN, G.N. and MONOD, J.:
Bacterial permeases.
Bact. Rev. 21, 169-194 (1957)
- 39) YUE-LIANG PAN and BLUMENTHAL, H.J.:
Correlation between acid phosphatase and coagulase
production or phage type of Staphylococcus aureus.
J. Bact. 82, 124-129 (1961)
- 40) UNDERHAY, E.E.:
The hydrolysis of indol esters by esterases of human
blood.
Biochem. J. 66, 383-390 (1957)

Herrn Prof. Dr. med. R. SIEGERT, Direktor des Hygiene-Instituts der Universität Marburg/Lahn, danke ich für die Überlassung des Themas und des Arbeitsplatzes sowie für die uneingeschränkte Förderung meiner Arbeit.

Ferner bin ich Herrn Dipl.Chemiker Dr. med. H. BÜRGER für seine Hilfsbereitschaft und freundliche Unterstützung bei der Durchführung der Versuche und Herrn Dr. med. W. MANNHEIM für die Überlassung der Bakterienstämme und freundliche Beratung zu herzlichem Dank verpflichtet.

Lebenslauf

Am 2. November 1940 wurde ich, Klaus Royé, als Sohn des Apothekers Werner Royé und seiner Ehefrau Ingeborg, geb. Dallmeyer, in Osnabrück geboren. Die Reifeprüfung legte ich am 24. Februar 1961 in Cappel / Kreis Marburg ab. Im Sommersemester 1961 begann ich das Studium der Zahnmedizin an der Universität Hamburg. Am 9. März 1964 bestand ich an der Universität Marburg an der Lahn das Zahnärztliche Physikum. Die weiteren 5 klinischen Semester verbrachte ich an der Universität Hamburg, München und an der hiesigen Universität, wo ich am 2. Februar 1967 das Zahnärztliche Staatsexamen bestand. Seit Mai 1967 arbeite ich als Assistent in einer Zahnarztpraxis in Nieder-Ohmen/Oberhessen.

Meine akademischen Lehrer waren die Herren Professoren und Dozenten:

- in Marburg: Bücher, Gedigk, Hennis, Hering, Heuser, Hohorst, Janke, Klingenberg, Korb, Lang, Maurath, Niessing, Pantke, Petry, Rodeck, Rosemann, Schmid, Seidel, Siegert, Siess, Staib, Walcher
- in Hamburg: Ahrens, Bautzmann, Fabian, Franke, Günther, Hausser, Heyns, Horstmann, Kirschner, Kosswig, Krauspe, Kühl, Kühnau, Menzel, Meyer, Müller, Nast, Neuert, Pfeiffer, Ritze, Schuchardt, Spiessl, Staubesand
- in München: Ascher, Boette, Fruhmann, Heiss, Holle, Lang, Linzenmeyer, Nasemann, Schauer, Schwarz, van Thiel, von Werz.

